

## TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI ORTIVE

COLTURE		EPOCA DI SEMINA	MODALITA' DI SEMINA	FIORITURA	RACCOLTA	PRINCIPALI PARASSITI	LOTTA ANTIPARASSITARIA	ESIGENZE IDRICHE	NOTE
	Pomodoro	febbraio - marzo maggio - giugno	in cellette con terriccio o su terreno ben concimato	60-80 gg. dopo semina	da giugno a settembre e anche a ottobre	viroso / peronospora ragno rosso / fusariosi ricamatrici / nematodi	moderata ma costante	ME - maggiori in luglio- agosto per le varietà indeterminate	l'ambiente protetto serve solo per le semine precoci
	Melanzane	AP - come sopra	come sopra	come sopra	prevalentemente in piena estate	ragno rosso / fusarium viroso	solo per ragno rosso da giugno a luglio	EL	come sopra
	Peperoni	AP - come sopra	come sopra	come sopra	estate / autunno	fusarium / verticillum viroso	come sopra	EL	come sopra
	Peperoncini	AP o anche in semenzaio come sopra	come sopra	40-45 gg. dopo semina	tutta l'estate e autunno	scarsi	nessuna	ME	tra le numerose varietà vi sono quelle resistenti
	Basilico	AP a marzo in vaso da aprile a luglio	generalmente in vaso (quelli ricci)		60-80 gg. post semina	fusariosi / viroso batteriosi / nematodi	nessuna	ME	varietà a foglie piccolissime o larghe nere o verdi
	Prezzemolo	AP gennaio - febbraio PC maggio - ottobre	pieno campo		80-90 gg. post semina	oidi	come sopra	SC ME/EL in estate	più saporito e pregiato quello nano
	Sedano	AP febbraio - marzo PC aprile - luglio	in semenzaio o in cellette		120 gg. post semina	fusariosi / viroso verticillosi	rara	EL	
	Zucche	AP marzo - aprile PC maggio - giugno PC agosto - settembre	diretta su terreno o in cellette	R - 60-120 gg. a seconda della varietà	da luglio a settembre	viroso / oidio ragno rosso / nematodi	solo contro il ragno rosso	ME/EL	più gustose quelle "piatte"
	Zucchine	come sopra	come sopra	come sopra	come sopra	viroso / oidio ragno rosso / nematodi fusarium / batteriosi	solo contro oidio e inizialmente contro il ragno rosso	ME/EL	vi sono varietà resistenti ai parassiti
	Cetrioli	come sopra	come sopra	come sopra	come sopra	come sopra	come sopra	ME/EL	come sopra
	Cocomeri	come sopra	come sopra	come sopra	come sopra	come sopra	come sopra	EL	come sopra
	Meloni	come sopra	come sopra	come sopra	come sopra	come sopra	come sopra	EL	come sopra
	Cetrangoli	come sopra	come sopra	come sopra	come sopra	come sopra	come sopra	ME/EL	si trovano sul mercato diverse varietà ibride
	Fagioli e fagiolini	da aprile a scalare fino ad agosto	diretta in pieno campo	R e anche NR	60 gg. post semina	oidio / ragno rosso nematodi / fusarium	solo contro il ragno rosso e fino alla 1a raccolta	ME	vi sono molte varietà nane o rampicanti

**Legenda abbreviazioni:** AP = ambiente protetto; PC = pieno campo; R = rifiorente; NR = non rifiorente; SC = scarse; ME = medie; EL = elevate